



Monty C. Wilson, DDS, FACS

Lisa N. Tran, DDS, MD, FACS

Diplomates American Board Oral and Maxillofacial Surgery

436 South Glassell Street, Orange, CA 92866

(714) 998-7450

www.OrangeOralSurgery.com

Los dientes superiores cerca de la parte posterior de la mandíbula superior suelen estar muy cerca del maxilar senos paranasales, que son cavidades llenas de aire debajo de los ojos y detrás de los pómulos. Una complicación frecuente de la eliminación de los dientes del molar superior (atrás) es la exposición suelo del seno. La mayoría de las exposiciones se curarán espontáneamente o con mínima intervención Siempre que las siguientes instrucciones se respetan estrictamente después de la cirugía:

- Algún sangrado nasal intermitente del lado de la cirugía es un ocurrencia. Por favor, no se alarmen.
- NO se vuele la nariz vigorosamente durante dos semanas. Hay un natural comunicación entre la nariz y el seno. Cualquier presión positiva en la nariz se transferirá directamente al seno y posteriormente a el sitio fresco de la extracción. Si se siente congestionada, descongestionantes como Drixoral, Dimetapp o Sudafed ayudará a reducir la presión en los senos paranasales.
- Por favor, mantenga la lengua alejada del sitio quirúrgico fresco. A medida que la hinchazón disminuye, los puntos de sutura pueden sentir como si estuvieran aflojando. Por favor, no corte prematuramente.
- No use pajitas durante dos semanas. La presión negativa generada por el la paja conducirá a la avería del sitio fresco de la extracción.
- NO fume durante dos a tres semanas. Fumar tiene una mayor profundidad efecto sobre las heridas orales que, en cualquier otra parte del cuerpo, ya que el efecto del humo está en contacto directo con la herida curativa. Ruptura de la herida y la curación deficiente es diez veces más frecuentes en los fumadores que en los no fumadores.
- Al estornudar, por favor hágalo con la boca abierta y no estornude sosteniendo la nariz. La presión generada debe liberarse sin transmitir a su Sinos.
- Se debe evitar cualquier cosa que cause presión en la cavidad nasal. Evitar llevando hacia abajo como al levantar objetos pesados, volar globos, tocando instrumentos musicales que requieran una acción soplante o cualquier otra actividad que aumente presión nasal o oral. El buceo y el vuelo en aeronaves presurizadas también pueden aumentar la presión sinusal y debe evitarse.
- Si no se adhieren a estas instrucciones, podría producirse un comunicación (fístula) entre la boca y el seno. Esto requeriría una cirugía adicional altamente invasiva que podría incurrir en más costos y horas de recuperación. La prevención es siempre la opción más prudente.